

BØRN MED

børneorm/ småorm



Forældrevejledningerne

Vejledningerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Herning, Randers, Skejby og Viborg børneafdelinger.

Hensigten med forældrevejledningerne er at give en ensartet vejledning til forældre på tværs af følgende sektorer: Sundhedsplejersker, praktiserende læger, vagtlæger og personalet på børnemodtagelserne i Region Midtjylland.

Vejledningerne kan ses og hentes fra internettet på hjemmesiden www.rm.dk/via53376.html

Yderligere pjecer kan bestilles hos Rikke Dalsgaard, Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland, Skottenborg 26, 8800 Viborg. rikke.dalsgaard@stab.rm.dk

August 2013



Børn med børneorm/ småorm

Generelt:

Børneorm, også kaldet småorm, er en infektion med orm i tyktarmen og endetarmen. Det er en lille hvid orm, som er 8 – 13 mm x 0,5 mm stor. Ormene er hvide og tynde som sytråde, som bevæger sig.

Børneorm er almindelig i hele verden, forekommer hyppigst i alderen 5 – 10 år. Tilstanden er sjældnere hos voksne, og ofte er flere personer i husstanden smittet.

Børneorm kan give anledning til bekymring, men er en særdeles fredelig tilstand. Som oftest giver børneorm ikke ubehag – ud over tanken om, at man har orm i tarmen.

Diagnosen stilles på det kliniske billede med kløe, og fund af små orm i endetarmsåbningen samt et »aftryk fra endetarmsåbningen«, som lægen bruger til mikroskopi.



Smitteveje:

Smitte sker direkte fra endetarm til mund. Du kan blive smittet ved kontakt med en person, som har æg fra børneorm på hænderne. Smitten kan også ske ved, at æggene befinder sig i et håndklæde eller ved, at æg bliver luftbårne, fordi de rystes løs fra smittet undertøj eller sengetøj.

Æggene overlever i op til 2 – 3 uger i støv og sengetøj.

Om natten lægger ormen æg ved endetarmsåbningen, da den tiltrækkes af varme.

Symptomer:

Symptomerne kommer især ved sengetid.

Typiske symptomer kan være:

- Endetarmskløe – rødme og rifter
- Mavesmerter
- Søvnbesvær
- Synlige orm der bevæger sig i afføringen eller omkring endetarmen
- Piger kan få udflåd fra skeden

Behandling/gode råd:

Børneorm behandles med ormekur i pilleform eller som flydende medicin. Hele husstanden behandles – også dem som ikke har symptomer.

- Bad om morgenen, så æggene fjernes
- Skift sengetøj, nattøj og undertøj hyppigt
- Klip neglene kort og rens dem dagligt

Grundig hygiejne er ekstremt vigtigt, både ved smitte og ved smittefare. Vask hænder ofte – og altid ved toiletbesøg og før måltider.

Hvornår søger man hjælp:

Hvis et af ovenstående symptomer opleves

Forebyggelse:

God håndhygiejne

Institution/dagpleje:

Barnet må gerne komme i institution. Oplys institutionen om, at barnet har børneorm.